

PRELEVEMENTS SANGUINS EXTERIEURS AU LABORATOIRE

Les examens écrits en BLEU sont à prélever à jeun.

TP	TCK/ TCA	Fibrinogène	D-Dimère			
AT3						
Iono (Na - K - Cl)	Albumine	Fer sérique	Cortisol	<u>βHCG</u>	<u>Hépatite A, B, C</u>	 7 mL GEL
Urée - Créat	Pré albumine	Ferritine	Prolactine	<u>ACE</u>	<u>HIV</u>	
Acide urique	Protéines totales	Transferrine saturation	Progestérone	<u>AFP</u>	<u>Toxoplasmose</u>	
CRP	IG-G-A-M (DPIG)	Bilan lipidique	Testostérone	<u>CA 125</u>	<u>Rubéole</u>	
PCT	β2 μglobuline	Troponine	Vitamine D	<u>CA 19-9</u>	<u>CMV</u>	
Bicarbonates	ALAT - ASAT	Facteur Rhumatoïde	PTH	<u>CA 15-3</u>	<u>Syphilis TPHA</u>	
Magnésium	GGT - PAL	NTBNP	Vitamine B12	<u>PSA</u>	<u>Sérologie COVID</u>	
CPK	Bili Totale et Libre	T3L T4L TSH	Folates B9	PSALibre		
Phosphore	Amylase - Lipase	FSH LH Oest	Insuline			
Calcium			(Homa / Quicki)			
EBV						
ATPO - ATG						
Ac Anti CCP	CTX (Crosslaps)	17-OH Progestérone	Anti Transglutaminase IG A			
Electrophorèse des protéines		Immunotypage (IT)				
IgE Totales	AMH					
Les analyses soulignées nécessitent une sérothèque, merci de prélever un tube (quelque soit le nombre d’analyses)						
Digoxine	Lithium					 5 ml SANS GEL
Posologie et date et heure de dernière prise nécessaires						
LDH						
Troponine US						
Groupage sanguin RAI						
Pour les groupes sanguins et les RAI, le nom de naissance (ex nom de jeune fille) est obligatoire quelque soit l'âge. Le numéro de la pièce d'identité présentée doit être enregistré						
NFS	VS	A1C	Réticulocytes			
BNP						
ACTH						
Paludisme (Antigène + frttis)						X2 
Glycémie						

PRELEVEMENTS DE BACTERIOLOGIE

ECBU	Pot stérile (Milieu de jet si miction spontanée) à ramener dans les 2H ambiant ou 12h au frigo ou transfert sur tube boraté
HEMOCULTURE	Prélèvement de 4 flacons (à demander au laboratoire), à ramener le plus rapidement possible au laboratoire après prélèvement
PEAU / PLAIE / PUS ORL (Nez / Gorge / Oreille) OCULAIRE GENITAL PRE-OP DEPISTAGE BMR	Ecouvillon type Swab (Transwab, eSwab) ; à défaut écouvillon sec
COPROCULTURE PARASITOLOGIE DES SELLES	Pot de coproculture à ramener dans les 2H au laboratoire
EXPECTORATION	Pot stérile Prélèvement à ramener au laboratoire dans les 2 heures après recueil (matin exclusivement)
SPERMOCULTURE	Pot stérile à ramener au laboratoire dans les 2H
CHLAMYDIAE URINAIRE	1 ^{er} jet d'urine dans un pot stérile
COVID	Prélèvements nasopharyngé / salivaire (Kit à demander au laboratoire)
DEPISTAGE HPV (Papillomavirus)	Pots Type ThinPrep (Kit à demander au laboratoire)

Renseignements cliniques à noter impérativement sur la feuille de prélèvement :

- Description de la zone du prélèvement (sec, squames, pus, rouge etc...) et du type de lésion(s)
- Localisation du la zone du prélèvement (si pas standard)
- Prise d'antibiotique ou topique (crème...)
- pour la CBU préciser si le contrôle est après traitement ou non

PRELEVEURS

Le prélèvement doit comporter :

- Nom / Nom de jeune fille
- Prénom
- Date de naissance
- Fiche C2 ENR 03 ou fiche de RDV des domiciles



Adéquation nombre de tube / analyses

TRANSPORT

Les échantillons issus **d'un patient** doivent être regroupés dans un **sachet individuel** et transportés en mallette isotherme.

Les échantillons doivent être acheminés **au laboratoire** au plus tard **4 heures après le prélèvement**, si glycémie sur tube fluoré ; et **2h** si glycémie sur tube sec.

Pour le CTX, le prélèvement doit être acheminé **au laboratoire** au plus tard **3 heures après le prélèvement**

Pour l'ACTH : le délai d'acheminement sur tube EDTA est de **15 minutes**. Des tubes Aprotinine (rose) sont disponibles au laboratoire pour un délai d'acheminement de 4h (cf. manuel de prélèvement en ligne).