PATIENT

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance : / /

Téléphone :

Adresse :

.....

.....

CP : VILLE :

N° Sécu :

Mutuelle N° AMC :

PRELEVEMENT

Date ... / ... / ... Heure :h

RESULTATS

Mail patient :

Mail médecin :

RECOMMANDATIONS

Depuis juillet 2019, la Haute Autorité de Santé recommande d'effectuer un dépistage du cancer du col de l'utérus tous les 5 ans

Ce dépistage peut être effectué par auto-prélèvement chez les femmes entre 30 et 65 ans en recherchant le Papillomavirus Humain (HPV).

Si cette recherche est négative, un prochain dépistage est à prévoir dans 5 ans.

Si cette recherche est positive, le laboratoire vous recontactera pour programmer un prélèvement de frottis cervico-vaginal.

RENSEIGNEMENTS

Date du dernier dépistage : ... / ... / ...

Antécédents pathologiques du col : oui/non

CONSERVATION

Le prélèvement doit être acheminé a

laboratoire dans les 24h

Écrire vos nom et prénom sur le flacon

Merci de joindre l'ordonnance avec

cette fiche de renseignement

RECEPTION (Réservé au laboratoire)

Nom :

Date :

Heure :

Conformité des échantillons à la réception :

Oui Non

Double contrôle de la saisie

Nom :

Signature :

En cas d'utilisation en procédure dégradée, joindre obligatoirement l'ordonnance

FIGURE 1

1. Ouvrir partiellement le sachet contenant l'écouvillon et le tube.
2. Enlevez l'écouvillon du sachet sans toucher le coton ni le poser.
3. Tenir l'écouvillon comme le montre la figure 1 : en le plaçant entre le pouce et l'index au milieu de la tige.

FIGURE 2

4. Introduisez doucement **la moitié de l'écouvillon** dans le vagin (figure 2), et tournez doucement l'écouvillon pendant **10 à 30 secondes**. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.
5. Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

FIGURE 3

6. Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. **Veillez à ne pas renverser le liquide présent dans le tube**. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit de prélèvement.
7. Placez l'écouvillon dans le tube, dans le liquide : le coton touche le fond du tube.
8. Cassez la tige (au niveau de la marque) sur le bord du tube (figure 3).

FIGURE 4

9. Revissez le bouchon (figure 4).
10. Après avoir bien refermé le tube, conservez-le à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans un délai de **24 heures**.